

## INTRODUCCIÓN

Es común encontrar diferentes errores funcionales en las personas, algunos pueden revestir mayor riesgo que otros. En este punto donde a todo profesional del área de la salud, le surge una duda y es ¿cómo intervenirlos? ¿en qué orden?. Al catalogar los diferentes riesgos funcionales por niveles, permitirá determinar cuál es el plan terapéutico más adecuado y qué estrategias “estratificadas” se utilizarán.



## RESULTADOS




TABLA DE RIESGOS PARA LA DEGLUCIÓN			Fase faríngea		
			Nivel de riesgo		
			Riesgo bajo (1)	Riesgo medio (2)	Riesgo alto (3)
Fase oral	Nivel de riesgo	Riesgo bajo (1)	(2)	(3)	(4)
		Riesgo medio (2)	(3)	(4)	(5)
		Riesgo alto (3)	(4)	(5)	(6)

## MÉTODOS



## CONCLUSIONES

Analizando los múltiples abordajes que se hacen en la clínica, lo que permite comprender que no se cuenta hoy en día con una herramienta que permita reconocer el nivel de riesgo de los distintos errores funcionales de la deglución que conllevan a una disfagia, lo que puede llevar a los profesionales a tener errores en los procedimientos como abordaje, evaluación e intervención.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Persson, E., Wårdh, I, y Östberg P. (2018). Repetitive Saliva Swallowing Test: Norms, Clinical Relevance and the Impact of Saliva Secretion. *Dysphagia*. Springerlink. 34(2),271-278.
- Murry, T., Carrau, R. y Chan, Karen (2018). *Clinical management of swallowing disorders*. San Diego: Ed. Plural Publishing.
- Vargas García, M. A. (2017). Repercusiones sociales de la disfagia. *Revista de logopedia, foniatría y audiolología*. 38, 77-83.
- Horiguchi, S. y Suzuki, Y. (2011). Screening Tests in Evaluating Swallowing Function. *Japan Medical Association journal: JMAJ*, 54(1), 31–34.